

1. Os Linfomas gástricos correspondem a mesmo de 5% de todos os tumores malignos do estômago, sendo, no entanto, o linfoma mais frequente do aparelho digestivo. Os linfomas Não Hodgkin recebem a classificação Musshoff e Ann Arbor conforme o grau de penetração das células malignas a partir da mucosa. Assinale a alternativa correta:
 - a) IE1: estende-se na submucosa.
 - b) IIE: envolvimento ganglionar estende-se além da parede gastrointestinal.
 - c) IIE1: comprometimento do trato gastrointestinal.
 - d) IVE: comprometimento de outros órgãos ou tecidos, sem ultrapassar área digestória.

2. As estatísticas mais recentes da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC) totalizaram 14.128 casos de morte por neoplasia no Brasil em 1998, colocando o câncer como a terceira causa de óbitos no país, no mesmo ano. Entre os tipos de neoplasia, a de esôfago foi registrada como a sexta causa de óbito, acometendo principalmente os homens. Assinale a alternativa correta das respectivas porcentagens:
 - a) 14,02% dos casos de óbitos/ 4,53% dos casos são de esôfago.
 - b) 18,03% dos casos de óbitos/ 6% dos casos são de esôfago.
 - c) 22,05% dos casos de óbitos/ 9% dos casos são de esôfago.
 - d) 27,08% dos casos de óbitos/ 7% dos casos são de esôfago.

3. Você está atendendo um paciente com as seguintes manifestações clínicas: Cólica biliar que não regride, dor em hipocôndrio, com irritação peritoneal, febre aferida de 39,7°C, icterícia regredindo. Ao exame laboratorial, amilase de 450U. Qual a hipótese diagnóstica correta?
 - a) Colecistite crônica.
 - b) Colecistite aguda.
 - c) Coledocolitíase.
 - d) Conlangite aguda.

4. Um paciente de 35 anos, do sexo masculino comparece ao seu ambulatório de especialidades com queixa de febrícula inexplicável, com lesão ileal. Dos achados físicos estão relacionados desnutrição global, com perda proteica e edema. Ao exame laboratorial, detectou-se anticorpo contra o *Saccharomyces cerevisiae*. Antes estes achados, qual a hipótese diagnóstica correta?
 - a) *Yersinia enterocolitica*.
 - b) *Campilobacter jejuni*.
 - c) Retocolite Ulcerativa.
 - d) Doença de Crohn.

5. A terapia para hepatocarcinoma pode ser dividida em quatro categorias, assinale a alternativa que indique uma delas, corretamente:
 - a) Intervenção cirúrgica (ressecção do tumor, sem hipótese de transplante de fígado).
 - b) Intervenção percutânea (injeção de etanol, porém sem ablação por radiofrequência).
 - c) Intervenção transarterial (embolização ou quimioperfusão ou quimioembolização).
 - d) Drogas, porém no tratamento do hepatocarcinoma, não incluem terapia gênica ou imune.

6. A cirrose é uma doença crônica do fígado decorrente e regeneração das células hepáticas, que acarreta, do ponto de vista histológico, a presença de fibrose e a formação nodular difusas, com consequente desorganização das arquiteturas lobular e vascular do órgão. No tratamento geral da cirrose inclui-se, corretamente:
 - a) Na hepatite C, INF-alfa ou peguilhado associados à ribavirina são drogas de escolha para pacientes com cirrose descompensada.
 - b) Na HAI o tratamento básico é realizado com uso de corticosteroide, associado ou não a azatioprina.
 - c) Nas cirroses biliares primárias utilizam-se ácidos ursodesoxicólico que quando apresentam má resposta, não se deve associar ciclosporina ou metotrexato.
 - d) Na cirrose criptogenética o tratamento é específico, com INF-alfa.

7. Podem-se caracterizar sinteticamente as várias fases da infecção pelo HBV, corretamente na alternativa:
 - a) Fase de infecção crônica: positividade do HBsAg, anti-HBc total, eventual presença de anti-HBc IgM e, dependendo da fase de evolução, positividade do HBeAg ou do anti-HBe.
 - b) Fase com viremia: presença do HBsAg, anti-HBe, anti-HBc IgM e anti-HBc total.
 - c) Fase de cura: presença do anti-HBs, anti-HBc total, sem presença de HBe.
 - d) Fase aguda com viremia: positividade do HBsAg, HBeAg, e anti-HBc IgM apenas.

8. Qualquer que seja o padrão de efeito citotóxico (idiossincrático ou dose-dependente) ou o mecanismo de lesão celular (direto ou indireto), a consequência final da hepatotoxicidade fármaco-induzido é o dano estrutural do parênquima hepático, cujas repercussões clínicas e laboratoriais vão depender do tipo de agressão histológica resultante. De acordo com os padrões histológicos das lesões hepáticas induzidas por drogas, é correto afirmar:
 - a) Lesões mistas (hepatocelular + colestase) – exemplos: fenitoína, azatioprina, pravastatina e clordiazepóxido.
 - b) Hepatite granulomatosa – exemplos: fenitoína, diltiazem, quinidina e amiodarona.
 - c) Necrose hepatocelular aguda – exemplos: dióxido de tório, cetoconazol, propiltiouracil e cloreto de vinila.
 - d) Hepatite crônica + fibrose cirrose – exemplos: arsênico, germander, ecstasy e rádio.

9. Considerando a definição de risco do padrão de agressividade do GIST, onde HPF significa *High Power Fields* (campos de grande aumento), é correto afirmar:
 - a) Grau de risco muito baixo, < 3 cm, com índice mitótico <5 por HPF.
 - b) Grau de risco baixo, 3 a 5 cm, com índice mitótico =5 por HPF.
 - c) Grau de risco intermediário, <5 cm, com índice mitótico de 6 a 10 por 50 HPF.
 - d) Grau de risco alto, sendo de qualquer tamanho com qualquer índice mitótico.

- 10.** São consideradas características da Síndrome do Intestino Irritável:
- Dor ou desconforto abdominal, de apresentação contínua ou intermitente, por no mínimo 10 semanas no último ano associados ao alívio de defecação.
 - Dor ou desconforto abdominal, de apresentação contínua ou intermitente, por no mínimo 12 semanas no último ano associados à mudança no ritmo de funcionamento intestinal e mudança na consistência das fezes.
 - Dor ou desconforto abdominal, de apresentação contínua ou intermitente, por no mínimo 14 semanas no último ano associados ao alívio de defecação e à mudança no ritmo de funcionamento intestinal.
 - Dor ou desconforto abdominal, de apresentação contínua ou intermitente, por no mínimo 10 semanas no último ano associados à mudança no ritmo de funcionamento intestinal e sem mudança na consistência das fezes.
- 11.** As técnicas de ressecção na Doença de Crohn de intestino delgado devem se limitar à ressecção do segmento macroscopicamente acometido, uma vez que já foi bem documentado que as ressecções amplas, além de não serem mais eficazes, podem culminar com a síndrome do intestino curto. A estenoplastias deve ser realizada em áreas com inatividade ou pouca atividade de doença e tem sua indicação mais precisa nos casos de estenoses curtas associadas a quadros obstrutivos, principalmente se o paciente possuir ressecções prévias. Mais recentemente, novas técnicas têm sido descritas para casos de estenoses longas e múltiplas, como a técnica de Finney, a de Jaboulay e a de Michelassi. Sendo assim é correto afirmar:
- A técnica de Finney é semelhante à de Jaboulay, porém neste caso um segmento de alça fica excluído do trânsito e têm sido menos utilizada.
 - A técnica de Michelassi é indicada nas estenoses muito longas e com paredes muito espessadas, e consiste na ressecção total do intestino no ponto médio da área estreitada.
 - A técnica de Jaboulay é indicada nas estenoses com 15 a 25 cm de extensão e consiste em uma incisão longitudinal sobre toda a extensão comprometida que se prolonga por 2 a 3 cm no tecido normal.
 - A técnica de Michelassi é semelhante a de Jaboulay, realiza-se uma sutura inicialmente na parede posterior e depois na parede anterior, pode ser manual ou mecânica e é indicada em estenoses de 10 a 20 cm de extensão.
- 12.** Comparativamente, Doença de Crohn (DC) e Retocolite Ulcerativa (RCU) apresentam diferenças clínicas e endoscópicas. Assinale a alternativa correta que corresponde ao diagnóstico diferencial entre ambas:
- A DC tem distribuição difusa, estenoses são incomuns e apresentam ulcerações aftosas.
 - Os pacientes com RCU raramente são fumantes, apresentam comumente sangue e muco em fezes e apresentam inflamação contínua.
 - Na DC as úlceras são lineares e sergipinosas, apresentam comumente sangue e muco em fezes e as mucosas apresentam-se granulosas.
 - Na RCU abscessos e fístulas são raras, a distribuição é focal, com áreas sadias e apresentam “pedra de calçamento”.
- 13.** Num algoritmo de investigação de dor abdominal crônica, isto é, dor abdominal superior a 3 meses, considerando recidiva e origem étnica compatível, qual a hipótese diagnóstica correta?
- Porfíria hereditária adquirida.
 - Pesquisa de mutação.
 - Intolerância à lactose.
 - Neoplasia.
- 14.** O envolvimento da cavidade oral pode ocorrer e qualquer momento durante o curso da doença inflamatória intestinal (DII) tanto na retocolite ulcerativa (RCU) quanto na doença de Crohn (DC), podendo inclusive preceder os sintomas intestinais por vários anos. Essas lesões orais costumam ser classificadas como específicas ou não específicas, em razão das modificações sistêmicas inflamatórias que ocorrem devido à atividade da doença. Quanto às lesões não específicas, é correto afirmar:
- 5 a 10% dos doentes apresentam aftas durante a fase ativa da doença intestinal, as úlceras são arredondadas com halo eritematoso e pseudomembrana central de fibrina.
 - Acometem distintas porções do trato gastrointestinal, sendo as úlceras lineares as exclusivamente características.
 - A queilite granulomatosa caracteriza-se clinicamente por edema firme, doloroso e persistente nos lábios, da mucosa bucal ou mesmo da face e podem ser observadas na Síndrome de Melkersson-Rosenthal.
 - As aftas maiores são profundas, incapacitantes e de demorada cicatrização podem ocorrer associadas à DC, mas não à RCU, como as aftas menores.
- 15.** Na Retocolite Ulcerativa (RCU) os sistemas de avaliação da doença incluem aspectos clínicos, laboratoriais e endoscópicos. Em 1955, Truelove e Witts publicaram o primeiro sistema de classificação de atividade da doença em que avaliam variáveis clínicas e laboratoriais como número de evacuações, sangramento, febre, frequência cardíaca, valor de hemoglobina e exame de VHS que estratificam a doença em graus leve, moderado e severo. O Escore de Mayo, por sua vez avalia atividade da doença que integra aspectos clínicos e endoscópicos de acordo com hábito intestinal, sangramento retal, aspecto da mucosa visto pela retossigmoidoscopia e apresentação clínica e difere do primeiro sistema citado pela capacidade de acompanhar e mensurar as mudanças de quadro clínico. Sendo assim, é correto afirmar que:
- Na classificação de Truelove e Witts, RCU leve equivale a ≤ 5 número de evacuações/dia, com pulso e temperatura normais, VHS < 30 e hemoglobina $> 10,6$.
 - Na Escala de Mayo, de 3 a 5 equivale a atividade leve de RCU, sendo evacuação de 5 ou + vezes além do habitual, evacuação apenas com sangue, com sangramento espontâneo, ulcerações.
 - Na Escala de Mayo, é considerada doença moderada quando há eritema evidente, perda do padrão vascular, erosões e sangue vivo na maioria das evacuações que são de 3 a 4 vezes além do habitual.
 - Na classificação de Truelove e Witts a RCU é considerada moderada quando os números de evacuações são de 5 a 7/dia, o pulso até 95bpm, hemoglobina e VHS intermediárias e ++ de sangue vivo nas fezes.

16. No que se refere à Hepatite Autoimune (HAI) é correto afirmar:

- a) A ausência dos três elementos histológicos mais importantes presentes na HAI – hepatite de interface, infiltrado molecular com plasmocitose exuberante e rosetas – constitui, pelos critérios de Chicago, importante argumento contrário ao diagnóstico dessa enfermidade acarretando redução de cinco pontos no score.
- b) Em todas as situações em que o paciente não se apresente com formas clássicas da HAI, está caracterizada a presença de uma forma variante ou forma sem marcador.
- c) Atualmente a biópsia hepática não é considerada como uma limitação da redução de seu poder diagnóstico nos casos de HSI com cirrose instalada. Nesta situação o componente inflamatório pode ser menor e as alterações mais típicas da doença podem estar ausentes.
- d) A presença de marcadores de replicação do VHC, com alterações histológicas de HAI, e de autoanticorpos em altos títulos podem necessitar de conduta terapêutica similar à dos quadros da forma variante de HAI, uma vez que o interferon pode exacerbar as manifestações autoimunes.

17. A constipação Intestinal é o sintoma de maior prevalência relacionado aos distúrbios intestinais e a segunda queixa mais frequente nas consultas ambulatoriais gastroenterológicas. Em relação à população geral, a constipação atinge mais crianças, idosos e mulheres, sendo que nesses grupos, a prevalência oscila entre 15% e 40%. Esta variação é, em grande parte, decorrente da heterogeneidade dos critérios que foram utilizados para definir constipação intestinal. Deste modo, é correto afirmar:

- a) Segundo Thompson *et al*, constipação intestinal é definida pela presença de esforço para evacuar em mais de 30% das evacuações, fezes endurecidas ou fragmentadas em mais de 25% das evacuações nos últimos 12 meses e, sensação de bloqueio/obstrução anorretal em mais de 40% das evacuações.
- b) Constipações podem “didaticamente” ser classificadas como orgânicas (mecânicas, neurogênicas, metabólico-hormonais e miopáticas), medicamentosas (opióceos, béquicos, bloqueadores de canal de cálcio, etc) e de causas diversas (uso abusivo de laxantes, falta de atividade física inércia colônica).
- c) Alguns medicamentos atuam como agonistas cloninérgicos e estimulam a musculatura lisa dos cólons como a neostigmina, que particularmente é utilizada na dose de 3mg IV para o tratamento da pseudo-obstrução colônica aguda – Síndrome de Ogilvie.
- d) O quadro clínico da constipação é bastante variável, sendo que alguns pacientes são até assintomáticos, apenas referindo evacuar a longos intervalos de tempo. Ao ato defecatório não se considera o escape fecal como parte do quadro clínico da constipação.

18. As vias biliares, como se sabe, podem ser divididas em quatro partes: ductos biliares intra-hepáticos, ductos hepáticos e colédocos, vesícula biliar e ducto cístico, ducto biliar comum intrapancreático e ampola de Vater. O conhecimento das anomalias congênitas das vias biliares é de grande relevância, principalmente para o Pediatra e o Gastroenterologista. Dentre as patologias que envolvem as vias biliares, é correto afirmar:

- a) A colecistite crônica constitui a doença biliar mais comum no mundo oriental, com prevalência no sexo feminino, além de relação com paridade, obesidade, diabetes, hipertrigliceridemia, etnia e hemólise.
- b) A colecistite aguda é decorrente da litíase vesicular em sua maior parte (85%). As colecistites agudas alitiásicas podem ocorrer em situações de politrauma, hipotensão, jejum prolongado e nutrição parenteral.
- c) Na colangite aguda descrita por Charcot, daí a Tríade de Charcot (dor, febre e icterícia) compor o quadro clínico habitual da colangite aguda, além de sinais e sintomas como confusão mental e hipotensão arterial, que estão relacionados à septicemia que ocorre nos casos mais graves.
- d) A grande maioria dos tumores das vias biliares é constituída de colangiocarcinomas. O diagnóstico é baseado na utilização de métodos de imagem que também devem fazer o estadiamento e planejamento do tratamento cirúrgico. A tomografia espiral (ou helicoidal) identifica o nível de obstrução em 80% dos casos.

19. Assinale a alternativa correta:

- a) A trombose portal também é frequentemente observada no pós-operatório de cirurgias da hipertensão portal em portadores da forma hepatoesplênica da esquistossomose mansônica, como a desconexão ázigo-portal com esplenectomia (DAPE).
- b) Na hipertensão portal pós-hepática, como a síndrome de Budd-Chiari em que há oclusão ou suboclusão das veias supra-hepáticas ou mesmo da veia cava inferior, ocasionando hepatomegalia, cujas causas podem ser tumores, insuficiência cardíaca e câmara direita, exceto anticoncepcionais, como se acreditava até então.
- c) Pacientes portadores de hipertensão portal secundária à forma hepatoesplênica da esquistossomose mansônica com monitoração hemodinâmica invasiva mostraram circulação hiperdinâmica – mais intensa que nos portadores de cirrose hepática em 90% dos pacientes pré-operatórios.
- d) Traumatismos, como acidentes automobilísticos com trauma abdominal fechado, também podem causar trombose de veia porta. Assim, a esplenomegalia e conseqüente hiperfluxo esplênico não são importantes na gênese da circulação hiperdinâmica na forma hepatoesplênica da esquistossomose, que ainda assim não é revertida com a esplenectomia.

20. A Doença do refluxo gastroesofágico (DRGE) é uma das afecções mais frequentes na prática médica. O aumento da prevalência e do número de internações causadas pela enfermidade, a melhor compreensão de suas complicações, além da disponibilidade de novos métodos de investigação e modalidades de tratamento, têm suscitado a realização de diversas reuniões internacionais de consenso quanto à conduta diante dessa afecção. São raras as pessoas que não experimentam pelo menos um episódio de pirose no decorrer da sua vida. É a manifestação clínica mais frequente da DRGE e:
- Ocorre em 10-20% da população em geral.
 - Ocorre em 12-15% da população em geral.
 - Ocorre em 15-20% da população em geral.
 - Ocorre em 17-22% da população em geral.
-
21. De acordo com o Código de Ética Médica é vedado ao médico, exceto:
- Causar dano ao paciente, por ação ou omissão, caracterizável como imperícia, imprudência ou negligência.
 - Assumir responsabilidade por ato médico que não praticou ou do qual não participou.
 - Deixar de esclarecer o paciente sobre as determinantes sociais, ambientais ou profissionais de sua doença.
 - Recusar-se a exercer sua profissão em instituição pública ou privada onde as condições de trabalho não sejam dignas ou possam prejudicar a própria saúde ou a do paciente, bem como a dos demais profissionais.
-
22. Dispõe o Código de Ética que na relação com pacientes e familiares é vedado ao médico:
- Deixar de atender paciente que procure seus cuidados profissionais em casos de urgência ou emergência, quando não haja outro médico ou serviço médico em condições de fazê-lo.**
 - Opor-se à realização de junta médica ou segunda opinião solicitada pelo paciente ou por seu representante legal.**
 - Abreviar a vida do paciente, salvo se for a pedido deste.**
- Apenas I está correta.
 - Apenas I e II estão corretas.
 - Apenas II e III estão corretas.
 - I, II e III estão corretas.
-
23. Analise as afirmativas abaixo e aponte a alternativa correta:
- É vedado ao médico deixar de esclarecer o doador, o receptor ou seus representantes legais sobre os riscos decorrentes de exames, intervenções cirúrgicas e outros procedimentos nos casos de transplante de órgãos.**
 - É vedado ao médico praticar concorrência desleal com outro médico.**
 - É vedado ao médico deixar de atestar óbito de paciente ao qual vinha prestando assistência, exceto quando houver indícios de morte violenta.**
- Apenas I e II estão corretas.
 - Apenas II está correta.
 - Apenas I e III está correta.
 - I, II e III estão corretas.
-
24. Acerca do Sistema Único de Saúde – SUS, assinale a alternativa incorreta:
- Os serviços do SUS, da rede própria ou conveniada, ficam obrigados a permitir a presença, junto à parturiente, de um acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.
 - Estão incluídas no campo de atuação do SUS a formulação e execução da política de sangue e seus derivados.
 - A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
 - É permitida a participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros na assistência à saúde.
-
25. Aponte a alternativa que NÃO possui um princípio do Sistema Único de Saúde – SUS:
- Integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.
 - Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
 - Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
 - Centralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.
-
26. Nos termos da Lei Orgânica do Município de Itu, analise as afirmativas abaixo sobre a responsabilidade do Prefeito e aponte a alternativa correta:
- Nos crimes de responsabilidade, o Prefeito será julgado perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, independentemente do pronunciamento da Câmara Municipal.**
 - Nas infrações político-administrativas, o Prefeito Municipal será julgado perante a Câmara de Vereadores, assegurada ampla defesa.**
 - As infrações político-administrativas serão apenadas com a cassação do mandato.**
- Apenas I está correta.
 - Apenas I e III estão corretas.
 - Apenas II e III estão corretas.
 - I, II e III estão corretas.
-
27. Acerca dos bens municipais, nos termos da Lei Orgânica do Município de Itu, assinale a alternativa incorreta:
- Constituem bens municipais todas as coisas móveis e imóveis, direitos e ações que, a qualquer título, pertençam ao Município.
 - Cabe ao Prefeito a administração dos bens municipais, respeitada a competência da Câmara quanto àqueles utilizados em seus serviços.
 - A aquisição de bens imóveis, por compra ou permuta, dependerá de prévia avaliação e autorização legislativa.
 - Os bens públicos municipais em nenhuma hipótese poderão ser utilizados para a publicidade particular.

28. Baseado na Lei Orgânica do Município de Itu, aponte a alternativa que completa corretamente a lacuna abaixo:
A primeira investidura em cargo ou emprego público depende sempre de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em Lei de livre nomeação e exoneração. O prazo de validade para o concurso será de até _____, prorrogável por uma vez, por igual período, a critério da autoridade competente.
- Seis meses.
 - Um ano.
 - Dois anos.
 - Três anos.
-
29. Dispõe a Lei Orgânica do Município sobre os servidores municipais que, exceto:
- Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo.
 - É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários à de três cargos de professor, à de um cargo de professor com outro técnico ou científico e à de dois cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde, com profissões regulamentadas.
 - O servidor municipal poderá exercer mandato eletivo, obedecidas às disposições legais vigentes.
 - O servidor municipal será responsável civil, criminal e administrativamente pelos atos que praticar no exercício de cargo ou função ou a pretexto de exercê-lo.
-
30. Nos termos da Lei Orgânica do Município de Itu compete ao Município instituir alguns tributos. Aponte a alternativa que possui aquele que não é de sua competência:
- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana.
 - Imposto sobre Operação Financeira.
 - Imposto sobre a transmissão "Inter-Vivos" a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis por natureza ou acessão física.
 - Taxa em razão do exercício de polícia.
-
31. Acerca da utilização do acento indicador de crase, analise as afirmativas abaixo e aponte a alternativa correta:
- Revirei aquele apartamento de ponta à ponta e não achei o comprovante de pagamento.**
 - Não vejo a hora de andar à cavalo naquela fazenda.**
- Apenas em I o acento indicador da crase foi empregado de forma correta.
 - Apenas em II o acento indicador da crase foi empregado de forma correta.
 - Em I e em II o acento indicador da crase foi empregado de forma correta.
 - Em I e em II o acento indicador da crase foi empregado de forma incorreta.
-
32. Acerca da regência nominal, analise as afirmativas abaixo e aponte a alternativa correta:
- O estagiário não está apto à promoção.**
 - Eu sou avesso a mentira.**
- Apenas I está correta.
 - Apenas II está correta.
 - I e II estão corretas.
 - I e II estão incorretas.
-
33. Acerca da regência verbal, assinale a alternativa incorreta:
- Eu não abdicarei da minha parte no imóvel.
 - A sua voz rouca agradou ao público.
 - É óbvio que ela aspira o meu cargo.
 - Ficamos sabendo que ela namora a filha do prefeito.
-
34. Acerca da concordância dos verbos, analise as frases abaixo e aponte a alternativa correta:
- A maior parte dos convidados elogiou a salada de camarão.**
 - Hoje são vinte de maio.**
- Apenas I está correta.
 - Apenas II está correta.
 - I e II estão corretas.
 - I e II estão incorretas.
-
35. Indique a alternativa em que há erro na concordância nominal:
- Em relação a este assunto, nós estamos quites.
 - Nem um nem outro funcionário merece o bônus bimestral.
 - Visto as assinaturas, podemos finalizar a reunião.
 - As roupas daquela loja custam caro.
-
36. O termo em destaque se classifica como:
A entrega dos livros foi feita com atraso.
- Adjunto adverbial.
 - Adjunto adnominal.
 - Complemento nominal.
 - Nenhuma das alternativas anteriores está correta.
-
37. **Com tamanha soberba, não chegará a lugar algum.**
A frase mantém o mesmo sentido se o termo em destaque for substituído por:
- Arrogância.
 - Simplicidade.
 - Timidez.
 - Expectativa.
-
38. Analise as orações abaixo:
- Estou com receio de que hoje irá chover.**
 - Troquei um milhão de amigos, por um verdadeiro.**
- Ambas estão no sentido conotativo.
 - Ambas estão no sentido denotativo.
 - Apenas I está no sentido conotativo.
 - Apenas II está no sentido conotativo.
-
39. Aponte a alternativa que completa, de acordo com a norma culta da língua, as lacunas abaixo:
Um dos _____ impostos pela _____ era que _____ a entrega das cestas básicas.
- Quesitos – direção – paralisassem.
 - Quesitos – direção – paralisassem.
 - Quesitos – direção – paralisassem.
 - Quesitos – direção – paralisassem.
-
40. Aponte a alternativa em que todas as palavras são femininas:
- Sósia – aguardente – libido – gengibre.
 - Dinamite – aguardente – cataplasma – libido.
 - Cataplasma – libido – sósia – gengibre.
 - Guaraná – dinamite – gengibre – sósia.

41. Time paulista que comemora neste ano seu centenário e que foi campeão paulista de 2012:
- Santos Futebol Clube.
 - Corinthians Sport Club.
 - Sociedade Esportiva Palmeiras
 - São Paulo Futebol Clube.
42. A Organização dos Estados Americanos revogou a decisão que excluía Cuba dessa organização. Em relação a esse assunto, pode-se afirmar que:
- As nações participantes da OEA pressionaram Cuba para o fechamento da prisão de Guantánamo.
 - A entrada de Cuba na organização resultou de uma manifestação do próprio governo cubano.
 - A decisão da OEA foi ignorada pelas nações da América Latina.
 - O Brasil manteve-se fora do processo de negociação sobre Cuba.
43. Em relação ao Oriente Médio, assinale a afirmativa incorreta:
- A UNESCO declarou Jerusalém como Patrimônio Cultural da Humanidade.
 - Um dos motivos causadores de conflitos armados é a disputa pelas reservas de petróleo.
 - O clima desértico permite a disputa por territórios mais ricos em recursos minerais.
 - Os traçados artificiais das fronteiras foram definidos pelos europeus.
44. Quantos múltiplos de 3 existem entre 31 e 100?
- 41.
 - 31.
 - 33.
 - 23.
45. O lucro de uma empresa é dado por $L(x) = 100(10 - x)(x - 2)$ onde x é a quantidade vendida. Podemos afirmar que:
- O lucro é positivo para qualquer que seja x .
 - O lucro é positivo para $x > 10$.
 - O lucro é positivo para $2 < x < 10$.
 - O lucro é máximo para $x = 10$.
46. Vendi um carro que paguei R\$ 28.700,00 com um prejuízo de 12,5%. Qual foi o valor da venda?
- R\$ 25.112,50.
 - R\$ 24.742,50.
 - R\$ 26.272,50.
 - R\$ 26.842,50.
47. Qual é a altura relativa à base de um triângulo isósceles cuja base mede 48 m e os outros dois lados medem 25 m cada um?
- 12 m.
 - 7 m.
 - 11 m.
 - 15 m.
48. Se duas máquinas fazem 15.000 etiquetas de roupas em 5 dias funcionando 8 horas por dia, em quantos dias 16 máquinas funcionando 10 horas por dia farão 210.000 etiquetas?
- 13 dias.
 - 11 dias.
 - 7 dias.
 - 10 dias.
49. Um tanque tem duas torneiras. A primeira enche o tanque em 8 horas e a segunda em 12 horas. Abrindo-se as duas torneiras ao mesmo tempo, e estando o tanque vazio, em quantas horas ficará ele cheio?
- 2 h e 36 min.
 - 5 h e 12 min.
 - 3 h e 20 min.
 - 4 h e 48 min.
50. Apliquei R\$ 7.200,00 por 11 meses e recebi o montante de R\$ 9.417,60. Qual foi a taxa mensal dessa aplicação?
- 4,3%.
 - 1,42%.
 - 2,8%.
 - 3,2%.